

Deze werkafspraken is samengesteld door de huisartsen regio Zwolle en de neurologen van Isala. De werkafspraken is mede becommentarieerd door de Isala apothekers, de openbare apothekers uit regio Zwolle en de Transmurale Stroke Service Zwolle. De werkafspraken sluit aan op de **NHG-standaard beroerte M103**.

## BEGRIPPEN

<b>Beroerte</b>	Overkoepelende term voor plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen.
CVA	Cerebro vasculair accident. Plotseling optredende focale uitval in cerebro ten gevolge van bloeding of infarct.
TIA	Transient ischemic attack. Plotseling optredende tijdelijke focale uitval in cerebro ten gevolge van een vasculair infarct. De uitval duurt minimaal enkele minuten en verdwijnt binnen het uur.
<b>TSSZ</b>	Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de ketenzorg CVA/TIA in regio Zwolle. Bereikbaarheid: <b>038-4242910</b> mailadres: <b>tssz@careketens.nl</b> CVA-Wijkverpleegkundigen: Icare 06-2185 5395 Carinova 06-1070 8872
<b>ROAZ</b>	Regionaal overleg acute zorg

## ANAMNESE-ONDERZOEK-EVALUATIE

Zie hiervoor de **NHG standaard M103**. Let op : in tegenstelling tot wat in de vorige werkafspraken en interline is besproken geldt nu dat geïsoleerde draaiduizeligheid (vertigo) wel verdacht kan zijn voor een CVA/TIA.

## VERWIJZING

### CVA

#### Verwijzing Verpleeghuis

Overleg met verpleeghuisarts indien opname in ziekenhuis niet meer gewenst is:

- I.v.m. comorbiditeit
- Uitdrukkelijke wens van de patiënt

#### Verwijzing Ziekenhuis

Overleg **altijd** met de dienstdoende neuroloog bij CVA. Deze beslist in alle gevallen over het te volgen traject.

Intraveneuze trombolysen  
(IVT)

- Tot 4,5 uur na het ontstaan van de uitval kan trombolysen worden toegepast.

Intra-arteriële trombectomie  
(IAT)

- Ook patiënten met uitval van onbekende duur (bijv. bij ontwaken) kunnen in aanmerking komen voor IVT in specifieke gevallen.

- Tot 6 uur na de uitval worden uitgevoerd.  
- In specifieke gevallen kan tot 24 uur na het moment dat zij nog gezond zijn gezien ingegrepen worden.

## TIA

### Verwijzing ziekenhuis

Overleg **altijd direct** met de dienstdoende neuroloog. Ook als het incident al een aantal dagen geleden is voorgevallen en ook in het weekend.  
Snel handelen is van belang.

Diagnostiek

Het streven is om diagnostiek en start van de behandeling en preventie binnen 24 uur na het incident af te ronden.

Medicatie

Bij verdenking van een TIA wordt gestart met clopidogrel **i.o.m. de neuroloog**. Eenmalig 300 mg en verder 1dd 75 mg onderhoud dosering.

## SECUNDAIRE PREVENTIE

Zie hiervoor de [MCC Klik werkafpraak CVRM](#) en de [NHG standaard CVRM](#).  
Neem de patiënt op in het ketenzorg-programma VRM.

## BELEID

### Ontslag naar huis

De CVA-wijkverpleegkundige (TSSZ keten) neemt telefonisch contact op met de patiënt binnen 3 weken. Er is nazorg tot 1 jaar na het CVA.  
Op indicatie volgt tevens een revalidatietraject of andere begeleiding op indicatie.  
De CVA-wijkverpleegkundige rapporteert aan de huisarts.

### Ontslag naar Verpleeghuis/ Revalidatiecentrum

Multidisciplinaire begeleiding intern en na afronding volgt overdracht naar de CVA-wijkverpleegkundige (TSSZ keten) die de patiënt tot een jaar lang vervolgt en rapporteert aan de huisarts.

### Patiënten < 70 jaar

Bij problemen kan verwezen worden naar Team Cognitieve Revalidatie of naar het afasieteam van Vogellanden.

### Patiënten > 70 jaar

Bij problemen kan verwezen worden naar geheugenpoli of geriatrische poli in het verpleeghuis.

### Hersenz behandeling

Na revalidatie is er via [Hersenz](#) behandeling mogelijk bij het omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Hiervoor is een CIZ-indicatie nodig. Verwijzen kan via ZorgDomein of [behandeling@interactcontour.nl](mailto:behandeling@interactcontour.nl).